

Université de Batna
Faculté de médecine

Corrigé type de TD 11 de Bio-statistique 2021/2022
(Anova 1 facteur)

Remarque : Dans les solutions des exercices, pour la comparaison de plusieurs variances on utilise la 2^{ème} méthode pour le calcul numérique par SPSS et la 3^{ème} méthode ou la 4^{ème} méthode pour le calcul à la main.

Règle :

Attention ! Il faut toujours mettre la variance la plus grande au numérateur.

Exercice 1 :

- a) Les conditions de validité de test de l'Anova :
- L'indépendance des échantillons
 - Normalité de la distribution des mesures
 - L'homogénéité des variances (Variances égales)
- b) Test d'égalité des variances : trois variances, donc on teste les variances deux à deux :

	N	Moyennes	Variances S
Sans substance	5	1.6	1.8
Avec l'alumine	6	4	2
Avec phosphates	5	2.6	1.3

- 1^{er} échantillon et 2^{ème} échantillon :

1. **Choix des hypothèses :**

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

2. **Calcul de la statistique de test observée :** $T_0 = \frac{S_2^2}{S_1^2} = \frac{2}{1.8} = 1.11$

3. **Le seuil critique de Fisher-Snedecor :** $F_{5;4;0.95} = 9.36$ table 5(B)

4. **Décision :** $F_{5;4;0.95} > T_0$

On accepte H_0 , variances égales.

- 2^{ème} échantillon et 3^{ème} échantillon :

1) **Choix des hypothèses :**

$$H_0: \sigma_2^2 = \sigma_3^2$$

$$H_1: \sigma_2^2 \neq \sigma_3^2$$

2) **Calcul de la statistique de test observée :** $T_0 = \frac{S_2^2}{S_3^2} = \frac{2}{1.3} = 1.54$

3) **Le seuil critique de Fisher-Snedecor :** $F_{5;4;0.95} = 9.36$ table 5(B)

4) **Décision :** $F_{5;4;0.95} > T_0$

On accepte H_0 , variances égales.

c) **Test de comparaison des moyennes (Anova 1 facteur) :**

- Substance : Facteur (variable indépendante qualitative) avec 3 niveaux ou échantillons.
- Quantité d'anticorps : Variable dépendante expliquée quantitative

1) **Choix des hypothèses :**

H_0 : Les moyennes égales

H_1 : Au moins l'une des trois est différente.

2) **Calcul de la statistique de test observée :**

Tableau de calcul à la main :

	Sans substance	Avec l'alumine	Avec des phosphates	
x_{ij}	1 ; 3 ; 3 ; 0 ; 1	2 ; 4 ; 5 ; 4 ; 3 ; 6	1 ; 4 ; 2 ; 3 ; 3	
N_i	5	6	5	N=16
$x_{i.} = \sum_{j=1}^{N_i} x_{ij}$	8	24	13	$x_{..} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^{N_i} x_{ij} = 45$
$x_{i.}^2$	64	576	169	
$\frac{x_{i.}^2}{N_i}$	12.8	96	33.8	$\sum_{i=1}^3 \frac{x_{i.}^2}{N_i} = 142.6$
$\sum_{j=1}^{N_i} x_{ij}^2$	20	106	39	$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^{N_i} x_{ij}^2 = 165$

$$SCE_t = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^{N_i} x_{ij}^2 - \frac{x_{..}^2}{N} = 165 - \frac{45^2}{16} = 38.4375.$$

$$SCE_{fa} = \sum_{i=1}^3 \frac{x_i^2}{N_i} - \frac{x_{..}^2}{N} = 142.6 - \frac{45^2}{16} = 16.0375$$

$$SCE_r = SCE_T - SCE_{fa} = 22.4$$

Alors :

$$T_0 = \frac{CM_{fa}}{CM_r} = \frac{SCE_{fa}/k-1}{SCE_r/N-k} = \frac{16.0375/2}{22.4/13} = 4.65$$

3) Identification de seuil critique :

$$F_{(k-1);(N-k);0.95} = F_{2;13;0.95} = \frac{3.89+3.68}{2} = 3.785$$

4) **Décision : $T_0 > F_{2;13;0.95}$**

On rejette H_0 , alors au moins une moyenne est différente, c'est-à-dire la présence ou non de la substance influe sur l'efficacité du vaccin.

- Maintenant, ce qui concerne la 2^{ème} partie de la question c, on va faire un test de l'anova 1 facteur :

Test de comparaison de deux moyennes (Anova 1 facteur) :

- Substance ajoutée : Facteur (variable indépendante qualitative) avec 2 niveaux ou échantillons {avec de l'alumine ; avec des phosphates}
- Quantité d'anticorps : Variable dépendante expliquée quantitative

1) **Choix des hypothèses :**

H_0 : Les moyennes égales

H_1 : Les moyennes différentes

2) **Calcul de la statistique de test observée :**

Tableau de calcul à la main :

	Avec l'alumine	Avec des phosphates	
x_{ij}	2 ; 4 ; 5 ; 4 ; 3 ; 6	1 ; 4 ; 2 ; 3 ; 3	
N_i	6	5	N=11
$x_{i.} = \sum_{j=1}^{N_i} x_{ij}$	24	13	$x_{..} = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{N_i} x_{ij} = 37$
x_i^2	576	169	
$\frac{x_i^2}{N_i}$	96	33.8	$\sum_{i=1}^2 \frac{x_i^2}{N_i} = 129.8$

$\sum_{j=1}^{N_i} x_{ij}^2$	106	39	$\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{N_i} x_{ij}^2 = 145$
-----------------------------	-----	----	--

$$SCE_t = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{N_i} x_{ij}^2 - \frac{x_{..}^2}{N} = 145 - \frac{37^2}{11} = 20.545$$

$$SCE_{fa} = \sum_{i=1}^2 \frac{x_{i.}^2}{N_i} - \frac{x_{..}^2}{N} = 129.8 - \frac{37^2}{11} = 5.345$$

$$SCE_r = SCE_T - SCE_{fa} = 15.2$$

Alors :

$$T_0 = \frac{CM_{fa}}{CM_r} = \frac{SCE_{fa}/k-1}{SCE_r/N-k} = \frac{5.345/1}{15.2/9} = 3.165$$

3) Identification de seuil critique :

$$F_{(k-1);(N-k);0.95} = F_{1;9;0.95} = 5.12$$

4) Décision : $T_0 < F_{1;9;0.95}$

On accepte H_0 , alors les moyennes sont égales, c'est-à-dire la nature de la substance n'influe pas sur l'efficacité du vaccin.

Tableau de variation (Anova par SPSS)

	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
Intergruppes	5.345	1	5.345	3.165	0.109
Intragruppes	15.2	9	1.689		
Total	20.545	10			

Exercice 2 :

- **Test de comparaison des moyennes (Anova 1 facteur) :**

- Traitement : Facteur (variable indépendante qualitative) avec 3 niveaux ou échantillons.
- Temps séparant la prochaine crise d'asthme : Variable dépendante expliquée quantitative

Les conditions de validité de test de l'Anova : **Satisfaites par énoncé.**

- L'indépendance des échantillons
- Normalité de la distribution des mesures
- L'homogénéité des variances (Variances égales)

1) **Choix des hypothèses :**

H_0 : Les moyennes égales

H_1 : Au moins l'une des trois est différente.

2) **Calcul de la statistique de test observée :**

Tableau de calcul par SPSS :(Anova 1 facteur)

	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
Intergruppes	1398.572	2	699.286	5.32	.009
Intragruppes	5258.033	40	131.451		
Total	6656.605	43			

$$SCE_{fa} = 1398.572$$

$$SCE_r = 5258.033$$

Alors :

$$T_0 = \frac{CM_{fa}}{CM_r} = \frac{SCE_{fa}/k-1}{SCE_r/N-k} = \frac{699.286}{131.451} = 5.32$$

3) Identification de seuil critique :

$$F_{(k-1);(N-k);0.95} = F_{2;40;0.95} = 3.23$$

4) **Décision** : $T_0 > F_{2;40;0.95}$

On rejette H_0 , alors au moins une moyenne est différente.

On conclut que les traitements ont une efficacité différente.

Exercice 3 :

Enceinte	Non enceinte
$\bar{X}_A = 4,29$ $S_A^2 = 0.65$	$\bar{X}_B = 2.17$ $S_B^2 = 0.41$

a) **Test de comparaison de deux moyennes : Anova 1 facteur**

ON doit réaliser un test d'homogénéité des variances :

1. **Choix des hypothèses :**

$$H_0: \sigma_A^2 = \sigma_B^2$$

$$H_1: \sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$$

2. **Calcul de la statistique de test observée** : $T_0 = \frac{S_A^2}{S_B^2} = \frac{0.65}{0.41} = 1.11$

3. **Le seuil critique de Fisher-Snedecor** : $F_{12;14} = \frac{2.95+3.15}{2} = 3.05$

Décision : $F_{12;14} > T_0$

On accepte H_0 , **variances égales** *

En revenant au test de comparaison :

- Etat de femme : Facteur (variable indépendante qualitative) avec 2 niveaux ou échantillons {enceintes non enceintes}
 - Activité de l'enzyme : Variable dépendante expliquée quantitative
- Les conditions de validité de test de l'Anova :
 - L'indépendance des échantillons (**Satisfaite par énoncé**)
 - Normalité de la distribution des mesures (**Satisfaite par énoncé**)
 - L'homogénéité des variances (Variances égales) (**Satisfaite par***)

Tableau de calcul à la main :

	Enceinte	Non enceinte	
x_{ij}	4.2 ; 5.5 ; 4.6 ; 5.4 ; 3.9 ; 5.4 ; 2.7 ; 3.9 ; 4.1 ; 4.1 ; 4.6 ; 3.9 ; 3.5	1.5 ; 1.6 ; 1.4 ; 2.9, 2.2, 1.8, 2.7 ; 1.9, 2.2 ; 2.8 ; 2.1 ; 1.8 ; 3.7 ; 1.8 ; 3.1	
N_i	13	15	$N = 28$
$x_{i.} = \sum_{j=1}^{N_i} x_{ij}$	55.8	32.6	$x_{..} = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{N_i} x_{ij} = 88.4$
$x_{i.}^2$	3113.64	1062.76	
$\frac{x_{i.}^2}{N_i}$	239.51	70.85	$\sum_{i=1}^2 \frac{x_{i.}^2}{N_i} = 310.36$
$\sum_{j=1}^{N_i} x_{ij}^2$	247.32	76.62	$\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{N_i} x_{ij}^2 = 323.94$

$$SCE_t = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{N_i} x_{ij}^2 - \frac{x_{..}^2}{N} = 323.94 - \frac{88.4^2}{28} = 44.308$$

$$SCE_{fa} = \sum_{i=1}^2 \frac{x_{i.}^2}{N_i} - \frac{x_{..}^2}{N} = 310.36 - \frac{88.4^2}{28} = 30.098$$

$$SCE_r = SCE_T - SCE_{fa} = 14.228$$

$$T_0 = \frac{CM_{fa}}{CM_r} = \frac{SCE_{fa}/k-1}{SCE_r/N-k} = \frac{30.098/1}{14.228/26} = 54.967$$

4) Identification de seuil critique :

- **Significative : $\alpha = 0.05$**

$$F_{(k-1);(N-k);0.95} = F_{1;26;0.95} = 4.23$$

4) **Décision : $T_0 > F_{1;26;0.95}$**

On rejette H_0 , les moyennes sont différentes.

- **Hautement Significative : $\alpha = 0.01$**

$$F_{(k-1);(N-k);0.99} = F_{1;26;0.99} = 7.72$$

Décision : $T_0 > F_{1;26;0.99}$

Décision statistique : La statistique de test se trouve dans la zone de rejet de H_0 pour $\alpha = 0.05$ et $\alpha = 0.01$.

Décision pratique : La différence est **hautement significative** entre les deux populations.

(La grossesse a une influence hautement significative sur l'activité de la PDE.)

b) **Test de comparaison de 5 moyennes (Anova 1 facteur) :**

- Age de grossesse : Facteur (variable indépendante) avec 5 niveaux ou échantillons.
- Dosage de l'enzyme : Variable dépendante expliquée quantitative
- Les conditions de validité de test de l'Anova : (Satisfaites par énoncé)
 - L'indépendance des échantillons
 - Normalité de la distribution des mesures.
 - L'homogénéité des variances (Variances égales)

1) **Choix des hypothèses :**

H_0 : Les moyennes égales

H_1 : Au moins l'une des trois est différente.

4) **Calcul de la statistique de test observée :**

- **Tableau de calcul par SPSS :(Anova 1 facteur)**

	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
Intergruppes	54.094	4	13.524	5.189	.009
Intragruppes	143.334	55	2.606		
Total	197.428	59			

$$SCE_{fa} = 54.094$$

$$SCE_r = 143.334$$

Alors :

$$T_0 = \frac{CM_{fa}}{CM_r} = \frac{SCE_{fa}/k-1}{SCE_r/N-k} = \frac{13.524}{2.606} = 5.189$$

5) Identification de seuil critique :

$$F_{(k-1);(N-k);0.95} = F_{4;55;0.95} = \frac{2.56+2.53}{2} = 2.545$$

4) Décision : $T_0 > F_{4;55;0.95}$

On rejette H_0 , alors au moins une moyenne est différente.

On conclut que l'âge de grossesse a une influence sur l'activité de l'enzyme.

